












圧迫骨折(安定型)

<予定入院期間 28日間>

1枚目/1枚中

日数	入院8日目	入院9日目～13日目	入院14日目	入院15日目～20日目	入院21日目～27日目	入院28日目(退院日)
治療・処置	安静が解除になります。					
薬・点滴	痛みに合わせて内服薬が処方されます。 また、眠れないときはご相談ください。寝付きをよくする薬を検討いたします。 座れるようになったら、骨粗鬆症の薬を処方します。					
検査			レントゲン検査を行います 骨密度の検査を行います			
安静度	コルセットが完成している場合。 痛みに応じて起き上がる事ができます。		日常的にサークル歩行ができるようになります (必要時看護師が付き添います)		杖歩行や伝い歩きができるようになります	
食事	通常の食事に戻ります。					
清潔	痛みの状況によりシャワー浴ができるようになります。 看護師が部分的に手伝います。		1人でシャワーに入れるようになります。場合により手伝います。			
排泄	痛みの状況によりトイレまで行って排泄を行うようになります。		1人でトイレに行くことができますようになります			
説明	適宜、医師より病状説明があります 					
その他	<ul style="list-style-type: none"> 退院後の介護保険や使用が予測される用具についてのご相談を承ります。 約6か月、起きている間はコルセットを着用してください。就寝中は外しても結構です。腰をひねる、過度な屈曲等の動作はやめてください。 			退院のための準備とリハビリをすすめていきます。		